

À partir de 6 ans

INCOLLABLES SUR LA VACCINATION



20 
QUESTIONS
RÉPONSES

LES VACCINS À EFFECTUER

De l'adulte à la personne âgée

LES RAPPELS À 25 ANS



- Diphtérie
- Tétanos
- Poliomyélite
- Coqueluche

LES RAPPELS À 45 ANS

- Diphtérie
- Tétanos
- Poliomyélite



À PARTIR DE 65 ANS QUE FAUT-IL FAIRE ?

- Diphtérie
- Tétanos
- Poliomyélite

Un rappel tous les 10 ans



- Grippe → Un rappel tous les ans

- Zona → Entre 65 et 74 ans

PRÉCAUTIONS VACCINALES DANS CERTAINES SITUATIONS

Maladies chroniques

La vaccination est particulièrement recommandée pour les personnes malades chroniques et/ou leur entourage.



Grossesse et projet de grossesse



Il est préférable de reporter les vaccinations après l'accouchement, sauf lorsqu'elles sont nécessaires en raison de circonstances particulières (voyage à l'étranger, épidémie...). La vaccination contre la grippe est recommandée chez la femme enceinte, quelque soit le stade de la grossesse.

Voyages

En cas de voyage à l'étranger, il est vivement conseillé : d'être à jour des vaccins recommandés en France et d'être protégé contre des maladies infectieuses qui circulent fortement dans la zone de destination.



Pour plus d'informations :
<https://vaccination-info-service.fr>

RÈGLES DU JEU

POUR JOUER À PLUSIEURS

LE PREMIER QUI MARQUE 10 POINTS

Chaque joueur (ou équipe) prend un éventail et pose une question à l'adversaire qui marque un point par bonne réponse, mais perd son tour s'il se trompe. Et ainsi de suite... jusqu'à 10 points.

LE MEILLEUR EN 2 MINUTES

Pendant 2 minutes, tu **bombardes ton adversaire** avec toutes les questions. Chaque bonne réponse vaut **1 point**. Ensuite, c'est à toi d'essayer de marquer plus de points, et donc de gagner !

POUR JOUER SEUL

Réponds aux questions d'une fiche et note tes réponses. Ensuite, vérifie et marque 1 point par bonne réponse ;
Objectif : un **sans-faute** !
100% de **bonnes** réponses.

Amusez-vous !



LES VACCINS À EFFECTUER

De la naissance à l'adolescence

DE 2 MOIS À 11 MOIS : LES PREMIÈRES INJECTIONS

- Diphtérie
- Tétanos
- Poliomyélite
- Coqueluche
- Pneumocoque
- Hépatite B
- Haemophilus influenzae b

Les dates des injections :

- 2 mois : 1^{re} inj. obligatoire
- 4 mois : 2^e inj. obligatoire
- 11 mois : 3^e inj. obligatoire



À PARTIR DE 5 MOIS : INJECTIONS CONTRE LE MÉNINGOCOQUE C

Les dates des injections :



- 5 mois : 1^{ère} injection obligatoire
- 12 mois : 2^{ème} injection obligatoire

LES RAPPELS

À partir de 6 ans :

- Diphtérie
- Tétanos
- Poliomyélite
- Coqueluche

Entre 11 et 13 ans :

- Diphtérie
- Tétanos
- Poliomyélite
- Coqueluche

LES INJECTIONS CONSEILLÉES

- 1 mois : BCG
- Entre 11 et 14 ans : HPV jeunes filles ET garçons*

* Recommandations pour les jeunes garçons applicables le 1^{er} janvier 2021.



Pour plus d'informations :
<https://vaccination-info-service.fr>

QUESTIONS

Vrai ou faux

1

Il n'existe aucun traitement pour la rougeole, la rubéole et les oreillons, à part la vaccination ?

Mon enfant a 3 ans et je ne l'ai pas fait vacciné à l'âge indiqué, je peux malgré tout demander à mon médecin de le vacciner maintenant ?



Une personne contaminée par la rougeole peut infecter entre 15 et 20 personnes ?

Les oreillons peuvent provoquer des complications graves : méningite, surdité, inflammation du pancréas ou des testicules ?

Les enfants les plus jeunes ne sont pas encore bien protégés contre les maladies : leur système immunitaire est fragile et a besoin d'être renforcé par la vaccination.



Le saviez-vous ?

La rougeole est une maladie très contagieuse due à un virus qui se transmet très facilement par la toux, les éternuements et les sécrétions nasales.

RÉPONSES

QCM

4

Un médecin / Une sage-femme.

Mon médecin / Le professionnel qui m'a vacciné.

Au réfrigérateur.



Demander conseil à mon médecin en apportant mon carnet de vaccination et inscrire dans mon agenda les dates clefs.

Entre 10 jours et 3 semaines.

Le saviez-vous ?

L'injection du vaccin peut être prise en charge à **100%** pour les personnes atteintes de certaines **affections de longue durée (ALD)** et pour les **femmes enceintes** à partir du 1er jour du 6e mois de grossesse.



RÉPONSES

Vrai ou faux

1

Vrai.

Vrai.

Vrai.

Vrai.

Vrai.

Le saviez-vous ?

Plusieurs millions de personnes sont vaccinées chaque année en France. Grâce à la vaccination, la **variole** a disparu dans le monde et la **poliomyélite** a disparu de France.



QUESTIONS

QCM

4

Qui peut prescrire le vaccin contre la rougeole ? :
un médecin / un kinésithérapeute /
une sage-femme.

Si je constate un effet indésirable après avoir été vacciné, je préviens : mon médecin / le professionnel qui m'a vacciné / personne.

Dès le retour de la pharmacie, votre vaccin doit être placé : au réfrigérateur / au congélateur / n'importe où.

Pour me rappeler les vaccinations à réaliser je peux consulter : demander conseil à mon médecin en apportant mon carnet de vaccination / inscrire dans mon agenda les dates clefs / ne rien faire.

À partir de quand est-on protégé par un vaccin : 48h / une semaine / entre 10 jours et 3 semaines.

Le saviez-vous ?

L'injection du vaccin peut être prise en charge à 100% pour les personnes atteintes de certaines affections de longue durée (ALD) et pour les femmes enceintes à partir du 1er jour du 6e mois de grossesse.



QUESTIONS

Vrai ou faux

2

Il n'est pas utile de se faire vacciner contre les maladies qui ne semblent plus exister.

Je n'ai pas besoin de me faire vacciner si je suis attentif aux gestes barrières (lavage des mains, tousser dans son coude, aérer...).



Il existe une date de péremption après laquelle le vaccin est inutilisable.

Il faut conserver le vaccin à l'intérieur du réfrigérateur mais pas dans la porte, où la température est plus élevée.

Pour les enfants, le carnet de santé sert de carnet de vaccination. Le carnet de vaccination peut remplacer le carnet de santé lorsqu'on est adulte.



Le saviez-vous ?

Avoir réalisé les **11 vaccins obligatoires** en France auprès de votre enfant est nécessaire pour que celui-ci entre en crèche ou à l'école.

RÉPONSES

QCM

3

Rougeole, oreillons, rubéole.

2.

À 12 mois puis entre 16 et 18 mois.

Les voies respiratoires.



À tout âge.

Le saviez-vous ?

Les vaccinations réalisées en PMI (pour les enfants de moins de 6 ans et les femmes enceintes) et en centres de vaccination sont **gratuites**.



RÉPONSES

Vrai ou faux

2

Faux.

Faux.

Vrai.

Vrai.

Vrai.

Le saviez-vous ?

La rougeole et rubéole sont des maladies à déclaration obligatoire en France (décret du 7 mai 2018).



QUESTIONS

QCM

3

ROR signifie : Rougeole, Oreillons, Rubéole / Rouge, Otite, Rhume / Rhume, Otite, Rougeole.



Combien de doses de vaccin sont nécessaires pour protéger contre la rougeole ? 1, 2, 3.

À quel âge doit-on réaliser le vaccin ROR : à 12 mois puis entre 16 et 18 mois / à 3 ans puis à 18 ans / à 25 et 40 ans ?

La rougeole, les oreillons et la rubéole sont des maladies qui se transmettent par : le sang / les voies respiratoires / les selles.

Vacciner contre la rougeole est utile car la rougeole est potentiellement grave : chez l'enfant / chez l'adulte / à toute âge.

Le saviez-vous ?

La période de contagion de la rougeole commence 5 jours avant l'éruption cutanée (apparition des boutons) et dure jusqu'à 5 jours après le début de l'éruption.



BON À SAVOIR

Les oreillons correspondent à une **maladie très contagieuse** due à un virus (virus « ourlien »).



Elle se transmet par l'intermédiaire de **gouttelettes de salive** contenant du virus. Dans 20 à 30% des cas, il n'y a aucun symptôme et l'infection passe inaperçue.

La rubéole est **bénigne**, sauf chez la femme enceinte. En effet, elle peut être responsable de **graves malformations** chez le futur bébé (lésions cérébrales, retard mental, atteintes oculaires ou atteintes auditives, etc.) lorsque les femmes enceintes contractent la rubéole dans les premiers mois de la grossesse.



Il est donc **indispensable** que toutes les femmes en âge d'avoir des enfants soient vaccinées.

L'utilité d'un vaccin c'est de se **protéger et de protéger les autres**, notamment les personnes les plus fragiles de son entourage : nouveau-nés, femmes enceintes, personnes souffrant d'une affection contre-indiquant la vaccination, personnes âgées, etc. C'est le cas notamment des vaccins contre la coqueluche et la rougeole qui assurent une **protection des nourrissons** en attendant qu'ils puissent être vaccinés.

Quelques conseils pour accompagner un nourrisson qui va se faire vacciner :

- Le rassurer en lui parlant doucement, sans manifester d'appréhension.
- Le tenir assis sur ses genoux ou le porter dans les bras le mettra en confiance.
- Si le nourrisson est allaité, le mettre au sein.
- D'autres méthodes peuvent être utilisées : doudou, distraction, jouet, musique...



POUR CERTAINES MALADIES, LA
VACCINATION EST LA SEULE PROTECTION !
PENSEZ-Y POUR VOUS, VOS ENFANTS ET
VOTRE ENTOURAGE.

JE PENSE À MOI ET AUX AUTRES,
JE SUIS VACCINÉ(E)

#MSPVACCINÉES

© 2021 FEMAS HAUTS-DE-FRANCE



FEMAS
Hauts-de-France