

Mises à jour du 9 au 24 novembre 2021

Vaccination

Recommandations

Schéma vaccinal pour les personnes infectées avant une vaccination : dose unique de vaccin chez les personnes ayant été infectées par la Covid-19, quel que soit leur âge et à réaliser 6 mois après l'infection avec le vaccin Comirnaty® ou Spikevax® (pleine dose). Se déplacer à l'étranger : une dose additionnelle n'est pas contre-indiquée

Schéma vaccinal pour les personnes infectées après une vaccination :

- 1 dose additionnelle 6 mois après l'infection pour les personnes éligibles au rappel et chez qui l'infection est survenue après un schéma vaccinal complet
- 1 seconde dose 6 mois après l'infection pour toutes les personnes chez qui une infection est survenue après avoir reçu une première dose de vaccin (schéma vaccinal incomplet)

HAS - 19 novembre 2021

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3300204/fr/covid-19-quel-schema-vaccinal-pour-les-personnes-infectees-avant-ou-apres-une-vaccination

En pratique

Dose de rappel pour les personnes de 40 ans et plus HAS 19 nov 2021

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3300258/fr/covid-19-la-has-preconise-une-dose-de-rappel-pour-les-personnes-de-40-ans-et-plus

Médicaments

Soins post-covid 19

Diagnostiquer et prendre en charge les symptômes prolongés chez l'adulte ajout pour les symptômes digestifs, les lésions oculaires et les troubles cutanés.

HAS - 19 novembre 2021

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3299823/fr/covid-19-diagnostiquer-et-prendre-en-charge-les-symptomes-prolonges-chez-l-adulte

Informations médecins

Scientific literature review . A digest of peer-reviewed articles from top-ranked journals on selected research topics related to SARS-CoV-2 and COVID-19

ANRS INSERM - 18 novembre 2021

https://www.anrs.fr/sites/default/files/2021-11/Literature_COVID19_18-11-2021.pdf